

ORDRE DES ACCIPITIFORMES

Vautour percnoptère *Neophron percnopterus* – A077

Espèce d'intérêt communautaire

ESPECES OISEAUX

~ RAPACES ~

08

Directive Oiseaux

Annexe I


Autres statuts de protection

Liste Nationale : Protégé
 Liste Rouge : Vulnérable

Convention de Berne : Annexe 2
 Convention de Bonn : Annexe 2
 Convention de Washington : Annexe 2

Règlement CITES : Annexe 1

Cité au bordereau du site



Source : "L'inventaire de la faune menacée en France", Nathan

CARACTERISTIQUES

- ⇒ **Descriptif** : Rapace à plumage noir et blanc contrasté
- ⇒ **Particularités** : Migrateur, présent de mars à septembre.
- ⇒ **Période de sensibilité** : Avril (ponte) à juillet (envol des jeunes)
- ⇒ **Historique** : Population sujette à de fortes baisses, en raison d'empoisonnements, de tirs, cumulés avec la baisse du pastoralisme et ponctuellement avec la pénétration du milieu (loisirs). Les populations espagnoles ont subi une chute d'effectif de moins 70 % dans l'Ebre et de moins 30 % en Aragon depuis la fin des années 1980. Stabilité des effectifs sur le versant pyrénéen français sur la même période.
- ⇒ **Effectifs** : 69 couples en France répartis entre les Pyrénées et le sud est. Environ 55 couples dans les Pyrénées françaises (27 couples reproducteurs recensés sur l'espace P.N.P. (zone centrale + zone périphérique) en 1998).

Sources : " Guide des rapaces diurnes", Benny Gensbol, éditions Delachaux et Niestlé ; Atlas du Parc National des Pyrénées, Gwenaëlle PLET "Coordination Percnoptère Pyrénées"

HABITATS

Niche en milieu rupestre. Se nourrit en milieux ouverts.

Sur le site :

- ◆ Falaises calcaires
- ◆ Eboulis
- ◆ Hêtraie, ...
- ◆ Toutes les pelouses, les landes pour le nourrissage.

ECOLOGIE DE L'ESPECE

- ⇒ **Nourriture** : cadavres d'animaux, insectes coprophages, déjections animales, rongeurs.
- ⇒ **Concurrence** : avec le Corbeau souvent signalée comme défavorable, mais attitude habituelle entre ces espèces. avec le Vautour fauve à surveiller dans les années qui viennent en raison de l'expansion des populations de ce dernier.

OBSERVATIONS SUR LE SITE « GRANQUET, PIBESTE, SOUM D'ECH »

↳ **Nidification** : Connue depuis au moins 1968. Principalement en versant sud Pibeste, parfois en versant nord (mail d'Arreau) et dans le passé dans le secteur de Cauci. Données ponctuelles également dans le secteur du Col d'Andorre et le vallon d'Iserou.

Première tentative (avortée) signalée sur le Pic du Jer en 2003, à quelques kilomètres à l'est du site

La reproduction est suivie depuis la fin des années 60 sur le massif, (par exemple, pour les trois dernières années, 3 reproductions avec envol d'un jeune pour le couple de Thou, et un seul envol d'un jeune et deux échecs pour le couple de Lascary).

↳ **Observation** : Pendant les comptages 1999 et 2003, suspicion de présence nocturne en forêt de Saint Pé de Bigorre. Aire de repos pour des individus non appariés, ou zone de présence régulière de l'un des couples connus ?

↳ **Observateurs** : PNP (Ch. HABAS), R.N.V., J.M. LAFFITTE, AMIDEV, B. VINAS

PRATIQUES ACTUELLES DETERMINANTES

Effets avérés

- Pastoralisme ↗ Favorable à l'espèce
- Décharge d'Agos Vidals ↗ Favorable à l'espèce. Source de nourriture

Effets potentiels

- Feux accidentels ↘ Les feux propagés aux falaises peuvent perturber voire détruire des nidifications ou des tentatives.
- Pastoralisme ↘ Possibilité de contamination par des antiparasitaires après ingestion de déjections ou de cadavres de bétail traité
- Aviation et vols ↘ Les survols des aires sont susceptibles de perturber la nidification

Pour mémoire :

- Escalade ↘ Dans le passé, le Vautour péronoptère a pu être perturbé par cette activité. Ce cas n'a plus été constaté depuis que cette pratique a été encadrée.

→ OBJECTIFS ET ACTIONS

↳ Cf Document de référence OISEAUX